

Aanbevelingen :

REZYME

- Leeftijd vanaf 12 jaar
- Zwangerschap/borstvoeding : neen
- 4 dagen stoppen voor een operatie.
- Proteolytische enzymen worden over het algemeen als veilig beschouwd, maar kunnen bij sommige mensen bijwerkingen veroorzaken.
- Het is mogelijk dat je last krijgt van spijsverteringsproblemen zoals diarree, misselijkheid en braken, vooral als je hoge doses inneemt(vanaf 6 capsules per dag)
- Er kunnen ook allergische reacties optreden. Mensen die bijvoorbeeld allergisch zijn voor ananas, kunnen ook allergisch zijn voor bromelaine (ananas), en inname ervan kan bijwerkingen veroorzaken zoals huiduitslag.
- Bovendien kunnen proteolytische enzymen de werking van bloedverdunnende medicijnen verstoren bij hoge dosering(vanaf 6 capsules per dag)
- Niet tegelijkertijd innemen met medicatie(4u er vanaf)

INZYME+

- Leeftijd: vanaf 12 jaar
- Zwangerschap/borstvoeding: neen
- Bijwerkingen: Rode iep kan de snelheid waarmee uw lichaam medicijnen opneemt vertragen, dus neem het niet in vlak voordat u uw medicijnen inneemt.
- Als u regelmatig medicijnen gebruikt.
- Niet innemen bij allergie voor papaya en latex
- Mensen met suikerziekte: max 2 capsules per dag

INZYME

- Leeftijd: vanaf 6 jaar
- Zwangerschap/Borstvoeding : neen
- Niet innemen bij allergie papaya en latex
- Mensen met suikerziekte : max 2 per dag

IMMUNO

- Leeftijd: vanaf 12 jaar (1 tot 2 per dag)
- Zwangerschap/borstvoeding : neen
- Niet tegelijkertijd innemen met bloedverdunders(4h van elkaar)
- Niet tegelijkertijd innemen met medicatie(4u er vanaf)

CELLFOOD

- Leeftijd: vanaf 6 jaar (1 per dag)
- Zwangerschap/borstvoeding : ja max 2 per dag
- Contra indicaties : geen

BIOMESUPPORT

- Leeftijd: vanaf 12 jaar
- Zwangerschap/borstvoeding : neen
- Contra indicaties: niet bij coeliakie en kanker
- Niet tegelijkertijd innemen met medicatie(4u er vanaf)

TRANSITPRO

- Leeftijd: vanaf 12 jaar
- Zwangerschap/borstvoeding : ja (2 x half maatschepje)
- Niet op hetzelfde tijdstip innemen met medicatie / supplementen(4u er vanaf)

HORMONICQ

- Leeftijd: vanaf 14 jaar
- Zwangerschap/borstvoeding : neen
- Zowel inzetbaar bij menopauze klachten als bij klachten tijdens menstruatie(krampen, onregelmatigheid)
- Contra indicaties : niet tegelijkertijd innemen met medicatie(4u er vanaf)